



**Osmocote[®]
Pro**

Pro 12-14M

Řešení výživy pro podzimní a jarní hrnkování

18 | 9 | 10 | 2.0 | TE
N P2O5 K2O MgO



Složení

Oxidy		
N	Celkový dusík	18%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	5.9%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	7.7%
	Močovinový dusík (N-Urea)	4.4%
P2O5	Oxid fosforečný	9%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	6.8%
K2O	Oxid draselný	10%
	vodorozpustný (K ₂ O)	10.0%
MgO	Oxid hořečnatý	2.0%
	vodorozpustný (MgO)	1.3%
B	Bór	0.018%
	vodorozpustný (B)	0.016%
Cu	Měď	0.045%
	vodorozpustná (Cu)	0.035%
Fe	Železo	0.35%
	Železo (Fe) jako EDTA chelát	0.07%
Mn	Mangan	0.049%
Mo	Molybden	0.017%
	vodorozpustný (Mo)	0.017%
Zn	Zinek	0.014%

Popis

Osmocote Pro 12-14M je hnojivo druhé generace s řízeným uvolňováním živin. Plně obalované NPK a stopové prvky. Lze aplikovat v plné dávce nebo v základní dávce s doplňkem vodorozpustných hnojiv. Pro snadnou identifikaci obsahuje Osmocote Pro barevné granule podle zvolené doby působení.

Výhody

- \\ Vysoký obsah NPK, Mg a stopových prvků
- \\ Pryskyřičný obal pro rovnoměrné uvolňování živin
- \\ Výborný poměr cena/výkon

Návod k použití

- 1 Produkt se doporučuje mísit s pěstebním médiem. Při aplikaci do sázecí jamky, konzultujte konkrétní situaci se zástupcem společnosti ICL
- 2 Osmocote Pro lze používat v kombinaci s vodorozpustnými hnojivy.
- 3 Doba působení hnojiva Osmocote ovlivňuje teplota (doba působení produktu se určuje při 21° C):
16° C: 15-17 months 21° C: 12-14 months 26° C: 9-11 months.
- 4 Pro citlivé rostliny doporučujeme použít Osmocote Exact
- 5 Částečně použité nebo poškozené obaly bezpečně uzavřete.
- 6 Skladujte v suchu.
- 7 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Dávkování

	Nízká dávka hnojiva	Průměrná dávka hnojiva	Vysoká dávka hnojiva
Kontejnerové školky	3-4 g/l	4-5 g/l	5-6 g/l

Upozornění V kombinaci s Osmocote Pro, přidávejte maximálně 0,5g/l startovacího NPK hnojiva. Dávky jsou uvedeny v gramech na litr objemu nádoby, jedná se o plné dávky. Tyto dávky jsou obecným doporučením a počítají se substráty bez předchozího hnojení. Výše zmíněná doporučení jsou pouze obecná. Specifické situace jako jsou skleníky, tunely nebo specifické klimatické podmínky, vyžadují konkrétní doporučení. Další informace a doporučení týkající se použití např. ve fóliovnících a sklenících získáte u svého poradce společnosti ICL. Změnu dávkování, způsobu aplikace či jiné změny nejprve vyzkoušejte na menší ploše. Vzhledem k různým pěstebním podmínkám a ke skutečnosti, že aplikace produktů je mimo kontrolu společnosti, ICL nemůže být zodpovědná za žádné negativní výsledky.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.